

Robert DEBRE
48 Bd Sérurier-75019 PARIS

LA NUTRITION PARENTERALE A DOMICILE



Rappels au patient
et sa famille

Service de Gastroenterologie

Pour tout problème, 7 jours/7 et 24h/24h

Standard 01 40 03 20 00

Poste 3710, 3028, 2289

Infirmière coordinatrice

Florence LIEBERT joignable au :

01 40 03 53 72 (sauf mercredi, week-ends et jours fériés)

Fax : 01 40 03 23 53

Florence.liebert@rdb.aphp.fr

Pharmacie de l'hôpital Robert Debré

Du lundi au vendredi 8h30 à 18 h

01 40 03 47 63

Référent : Dr STORME au 01 40 03 40 49

Service NPAD

Du lundi au vendredi 9h à 17h



01 45 13 66 40

Service de Gastroentérologie, Nutrition Pédiatriques et Mucoviscidose
Pr Cézard

Qu'est-ce que c'est ?

- * La nutrition parentérale apporte les nutriments (sucres, protéines, vitamines...) directement dans le sang par perfusion à l'aide d'un cathéter central (KTC).
- * Elle est indiquée lorsque l'alimentation par voie orale ou entérale (dans le système digestif) est impossible ou insuffisante.
- * La formation à la nutrition parentérale se fait exclusivement dans le centre agréé pendant environ 3 à 4 semaines (service de gastro).

3 REGLES DE BASE



Si fièvre à la maison :

(ou hypothermie < 36°C)

Découvrir l'enfant,
Reprendre la température
une demi-heure après

Si persistance appeler dans
le service pour avoir les



Venir directement
en gastro-entérologie

Si obstruction, fissure ou déplacement du KTC :

Téléphonez dans le service et
venir très rapidement.

Si aspect anormal du point d'insertion :

(rougeur, écoulement, bourgeon ...)
Téléphonez dans le service et
si possible envoyer une photo
par mail.

Matériel pour le branchement

- * Un plateau de parentérale contenant :
 - * 2 champs stériles
 - * Des compresses
 - * Une seringue préremplie de 10ml de sérum physiologique
- * Une paire de gants stériles
- * Une dose de Bétadine jaune
- * Une blouse stérile et une non stérile
- * Masques, charlottes, Manugel
- * 1 filtre Pall
- * Gazofix, film plastique
- * 1 tubulure de nutrition parentérale
- * 1 électrospirale
- * La poche de nutrition parentérale

Matériel pour le débranchement et le pansement de KTC

- * Un plateau de parentérale contenant :
 - * 2 champs stériles
 - * Des compresses
 - * Une seringue préremplie de 10ml de sérum physiologique
- * Une paire de gants stériles
- * Une dose de Bétadine jaune
- * Une blouse stérile et une non stérile
- * Masques, charlottes, Manugel
- * 1 seringue de 2,5 ml
- * Gazofix, film plastique
- * 1 ampoule d'héparine 5 ml=500 UI
- * Autoflush
- * 1 monodose de sérum physiologique
- * 2 paquets de 5 compresses stériles
- * Stéristrips
- * 1 pansement type Optiskin
- * 1 rouleau d'Hypafix

A domicile, il est important de

- * Prévoir un endroit propre nécessaire à votre soin
- * Conserver les poches dans le frigo spécifique
- * Prévoir du matériel supplémentaire et une poche de nutrition d'avance
- * Vérifier le matériel et les poches à leur arrivée à la maison (identité, date de péremption, quantité prescrite, intégrité)
- * Nettoyer le matériel fixe avec une lingette désinfectante
- * Ne pas oublier la pince à clamer dans vos déplacements

